

متوفر اختبار كوفيد-19 المجاني للمستضدات السريعة في المنزل من الصحة العامة في أوستن Austin Public Health

لتحديد موعد اختبار منزلي، اتصل على الرقم 512-972-5560. الاختبار مجاني.

من الذي يجب أن يخضع لاختبارات المستضدات السريعة في المنزل؟ الموظفون أو الطلاب المصابون بواحد أو أكثر من هذه الأعراض الشبيهة بكوفيد-19:

- الشعور بالحمى أو ارتفاع درجة الحرارة عن 100.0 درجة فهرنهايت أو تساويها
- فقدان حاسة التذوق أو الشم
- سعال
- صعوبة في التنفس
- ضيق في التنفس
- إعياء
- صداع
- رعشة
- التهاب الحلق
- احتقان أو رشح الأنف
- اهتزاز أو ارتعاش مبالغ فيه
- آلام شديدة في العضلات أو آلام في الجسم
- إسهال
- غثيان أو تقيؤ

من يمكنه الحصول على اختبار سريع في المنزل؟ الموظفون أو الطلاب الذين يعانون من أعراض شبيهة بكوفيد-19 والذين يعيشون في أوستن / مقاطعة ترافيس وكانوا في منطقة العمل أو المدرسة أو الأنشطة الأخرى في المدارس التالية بالعنوان الأول (تخضع قائمة المدارس للتغيير):

Elementary Schools

- Allison
- Barbara Jordan
- Barrington
- Blazier
- Brown
- Cook
- Graham
- Guerrero Thompson
- Hart
- Houston
- Langford
- Linder
- McBee
- Overton
- Padron
- Palm
- Perez
- Pickle
- Reilly
- Rodriguez
- Uphaus
- Walnut Creek
- Webb Primary
- Widen
- Wooldridge

Middle Schools

- Dobie
- Garcia YMLA
- Mendez
- Webb

High Schools

- LBJ
- Navarro
- Northeast



متوفر اختبار كوفيد-19 المجاني للمستضدات السريعة في المنزل من الصحة العامة في أوستن Austin Public Health

كيف يتم إجراء الاختبار؟ يتم إجراء الاختبار باستخدام مسحة من الأنف (في الجزء الأمامي غير العميق من فتحتي الأنف فقط). ستحصل على نتائج اختبار المستضدات السريعة خلال 15 دقيقة أثناء الزيارة المنزلية.

من الذي سيقوم بالاختبار؟ سيأتي أحد موظفي العيادة للصحة العامة بأوستن Austin Public Health إلى منزل الشخص في الموعد والوقت المتفق عليهما لإجراء الاختبار.

إذا كانت نتيجة اختبار المستضدات السريعة إيجابية: يجب على الشخص الذي أثبتت نتيجته إيجابية (أو والديه) إخطار المدرسة على الفور. ويجب عليهم عزل أنفسهم وعدم العودة إلى المدرسة حتى:

- مرور 10 أيام منذ ظهور الأعراض،
- ومرور 24 ساعة بدون حمى بدون استخدام الأدوية الخافضة للحمى،
- وحتى تتحسن الأعراض الأخرى لكوفيد-19*

* قد يستمر فقدان حاسة التذوق والشم لأسابيع أو شهور بعد التعافي ولا داعي لتأخير انتهاء العزل

إذا كانت نتيجة اختبار المستضدات السريعة سلبية: يجب أن يتبع الاختبار السلبي للمستضدات السريعة باختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). يمكن القيام بذلك خلال الزيارة نفسها داخل المنزل. يجب عزل الشخص حتى تصبح نتائج اختبار PCR جاهزة. يستغرق هذا من 3 إلى 5 أيام.

إذا كانت نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR سلبية، فهذا يعني أن الشخص لم يكن مصابًا بكوفيد-19 في وقت الاختبار. لمعرفة متى يمكن للطلاب التي كانت نتيجة اختبارهم لكوفيد سلبية ولكنهم مرضى يعانون من أعراض أخرى العودة إلى المدرسة، اتصل بموظفي الغرفة الصحية بالمنطقة. يجب على الموظفين الذين يعانون من الأعراض ونتيجتهم سلبية الاتصال بمكتب إجازة AISD عبر leaveoffice@austinisd.org لمعرفة متى يمكنهم العودة إلى العمل.

إذا كانت نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) إيجابية، فهذا يعني أن الشخص مصاب بكوفيد-19. يجب على الشخص الذي أثبتت نتيجته إيجابية (أو والديه) إخطار المدرسة على الفور. ويجب على الشخص عزل نفسه وعدم العودة إلى المدرسة حتى:

- مرور 10 أيام منذ ظهور الأعراض،
- ومرور 24 ساعة بدون حمى بدون استخدام الأدوية الخافضة للحمى،
- وحتى تتحسن الأعراض الأخرى لكوفيد-19*

* قد يستمر فقدان حاسة التذوق والشم لأسابيع أو شهور بعد التعافي ولا داعي لتأخير انتهاء العزل

